

Principali motivazioni di Sospensione

Il donatore, al momento della donazione, non deve in alcun modo mettere a rischio la salute del ricevente né la propria.

Prima di effettuare la donazione deve controllare di non avere malattie o situazioni di rischio estemporanee e, se queste sono recenti, che sia trascorso il periodo di quarantena (*vedi sotto*).

Inoltre deve comunicare tempestivamente qualunque malattia occorsa il giorno della donazione o nelle 24 ore successive.

Il periodo di sospensione va calcolato a partire dal giorno di risoluzione dell'indisposizione, dell'ultima assunzione di farmaci, del termine delle varie cure, dell'intervento chirurgico, del rientro dall'ultimo viaggio effettuato all'estero, ecc

Categoria	Descrizione	Periodo di sospensione
<u>malattie infettive</u>	<i>Influenza, bronchite, faringite, ecc</i>	15 giorni
	<i>Raffreddore</i>	7 giorni
<u>farmaci</u>	<i>Aspirina, antinfiammatori, analgesici, antipiretici</i>	5 giorni
	<i>Antibiotici e cortisonici</i>	15 giorni
	<i>Isotretinoina (acne)</i>	2 mesi
	<i>Etretinato (psoriasi)</i>	esclusione
	<i>Psicofarmaci</i>	3 mesi
	<i>Tutti gli altri farmaci</i>	24 ore
<u>vaccini</u>	<i>Febbre gialla, rosolia, TBC, parotite, morbillo</i>	1 mese
	<i>Epatite A e B, antitetanica, antitifica, antinfluenzale, antirabbica (senza morso)</i>	2 giorni
	<i>Sieroprofilassi: antitetanica</i>	3 giorni
	<i>antiepatite (in seguito esposizione a rischi di epatite)</i>	1 anno
<u>allergie stagionali</u>	<i>Periodo di riacutizzazione</i>	15 giorni
<u>cure dentarie</u>	<i>Non cruenta (otturazione, pulizia, ecc)</i>	2 giorni
	<i>Cruente (estrazioni, devitalizzazioni, interventi sulle gengive, ecc)</i>	7 giorni
	<i>Implantologia</i>	4 mesi
<u>interventi chirurgici</u>	<i>Maggiori (degenza superiore a 3 giorni)</i>	4 mesi
	<i>Minori (degenza inferiore o uguale a 3 giorni)</i>	1 mese
	<i>In Day Hospital o ambulatorio ospedaliero</i>	7 giorni
<u>esami endoscopici</u>	<i>Gastroscoopia, colonoscopia, artroscopia, ecc</i>	4 mesi
<u>altre pratiche</u>	<i>Tatuaggi, piercing, foratura delle orecchie, agopuntura (senza aghi monouso)</i>	4 mesi
<u>viaggi all'estero</u>	<i>In Europa o nell'America del Nord</i>	nessuno
	<i>In Paesi tropicali</i>	6 mesi
	<i>In Paesi tropicali con febbre nei 6 mesi dal rientro</i>	fino a 3 anni
	<i>In altri stati</i>	da valutare