

**Criteri di accettabilità per la donazione**

Età	18-60 anni	Donatore per la prima volta
	18-65 anni	Donatore periodico
	Oltre 65 anni	Solo donatore periodico e dopo valutazione cardiologica
Peso	Maggiore o uguale a 50 Kg	
Pressione arteriosa	Sistolica 110-180 mm Hg	
	Diastolica 60-100 mm Hg	
Polso	50-100 battiti al minuto ritmico e regolare	
Emoglobina	Maggiore o uguale a 12,5 g/dL	Donne
	Maggiore o uguale a 13,5 g/dL	Uomini
Intervallo di tempo tra donazioni	90 giorni	Uomo o donna non in età fertile
	180 giorni	Donna in età fertile

**Motivi e durata delle sospensioni**

**INTERVENTI CHIRURGICI E ODONTOIATRICI**

Interventi di superficie	Asportazione di verruche, nevi,	1 settimana e fino a guarigione della ferita
Interventi di rilievo		4 mesi dall'intervento
Interventi chirurgici in endoscopia		4 mesi dall'intervento
Diagnostica endoscopica	Gastroscofia, colonscopia, ecc.	4 mesi
Pulizia ed igiene orale		48 ore
Estrazioni dentarie, devitalizzazioni		1 settimana
Implantologia		4 mesi

**MEDICINALI**

Antibiotici		15 giorni dal termine della terapia
Cortisonici		15 giorni dal termine della terapia
Antispastici	Buscopan	7 giorni dal termine della terapia per via orale
		15 giorni dal termine della terapia intramuscolo
Antinfiammatori/Antidolorifici	Aulin, Oki, Moment, Voltaren, Muscoril, Toradol, Feldene, Aspirina, Vivin C, ecc.	5 giorni dal termine della terapia per via orale
		15 giorni dal termine della terapia intramuscolo

Unico farmaco consentito: Paracetamolo (Tachipirina, Efferalgan)

**MALATTIE**

Febbre	Superiore a 38°	5 settimane dopo la cessazione dei sintomi
Raffreddore		3 giorni dopo la guarigione

Altre malattie infettive		2 settimane dopo la guarigione
<b>A RISCHIO DI INFEZIONE HHV, HCV, HIV</b>		
Agopuntura		4 mesi dall'ultima esposizione al rischio
Tatuaggi, piercing, foratura lobi		4 mesi dall'ultima esposizione al rischio
<b>VACCINAZIONI</b>		
Vaccini con virus o batteri vivi	Vaiolo, rosolia, parotite, morbillo, poliomielite (orale)	4 settimane
Vaccini con virus uccisi o batteri inattivi	Epatite A e B, influenza, pertosse, poliomielite (iniezione), colera, antitetanica (richiamo)	72 ore
Vaccini con sieri di origine animale	(antivipera)	3 mesi
<b>GRAVIDANZA</b>		
Durante la gravidanza		Sospensione
Post partum		1 anno dopo il parto
Interruzione di gravidanza		6 mesi dopo l'interruzione